



ENFERMEDADES EMERGENTES



Hepatitis, de origen desconocido

No hay alerta

Cifras globales:

1010 casos probables en niños de **35** países.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) cifras julio 2022.

En **Colombia** se han detectado casos esporádicos, algunos no han sido relacionados a este tipo de hepatitis.

Causa

Desconocida y/o asociada a virus de infancia (adenovirus) y covid-19.

Síntomas

- Ictericia - Color amarillo en mucosas y en la piel (encías, mejillas internas) y los ojos.
- Acolia y coluria - Orina muy amarilla y deposiciones muy blancas.
- Astenia y adinamia - Decaimiento y postración.
- Dolor abdominal
- Fiebre.
- Vómito.

Tratamiento

- Manejo sintomático que puede ser en casa.
- En casos descritos que se complican requiere hospitalización y en casos extremos, trasplante hepático.

MITO VS REALIDAD

¿La hepatitis está relacionada con la vacuna para covid 19?



La OMS sugiere que no, pues no todos los niños con este tipo de hepatitis han sido vacunados.

Fuente: Dr. Tomás Díaz, coordinador del Servicio de Pediatría del Hospital Infantil Universitario de San José.

Viruela del mono

Emergencia de salud pública de importancia internacional

Cifras globales:

Más de **25,000** Casos confirmados en el mundo.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) cifras julio 2022.

273 Casos confirmados en Colombia.

Fuente: INS, cifras agosto 2022.

Años 70

Se detectó en humanos en la República Democrática del Congo.

mayo 2022

Aumento súbito de casos a nivel global.

Causas

- Por contacto estrecho piel con piel.
- Contacto con el salpullido o costras.
- Por indole sexual, aunque no es exclusivo de transmisión sexual.
- También se transmite por fluidos corporales, estornudos o tos.

Síntomas

Los síntomas pueden aparecer entre **5 a 21 días** después de haber tenido contacto con una persona enferma.

Fiebre

Después de **1 a 3 días** del inicio de la fiebre aparecen las lesiones en la piel:

Son ampollas que se llenan de agua en diferentes partes del cuerpo como cara, mucosa oral, palmas de las manos y plantas de los pies, genitales y ano, degeneran en costras hasta sanar. Este proceso puede durar de **2 a 4 semanas**.

Dolor de cabeza

Cansancio intenso

Dolor muscular

Inflamación de los ganglios linfáticos (síntoma que no aparece en la viruela común).

Tratamiento

- Manejo sintomático con medicamentos.
- Manejo intrahospitalario en caso de complicaciones sistémicas.

MITO VS REALIDAD

¿La Viruela del Mono se da solo por relaciones sexuales entre hombres?

Se concentra entre hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres que tienen la enfermedad y parejas múltiples, según la OMS y el CDC en EE.UU.

En Colombia ya hay transmisión local.

Fuente: Dra. Patricia Reyes, jefe del Servicio de Infectología del Hospital Universitario Infantil de San José.

Prevención

Evitar contacto directo y usar protección respiratoria.